

FICHA TÉCNICA

1. Producto:

Nombre: **EDICTO®**

2. Número de registro:

17.502

Denominación común:

Lebron

3. Composición:

Teflutrin 5 g/kg (0,5% p/p)

4. Formulación:

Granulado (GR).

5. Descripción:

Insecticida de contacto para uso profesional en cultivos al aire libre con incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador.

6. Clasificación toxicológica:



ATENCIÓN

H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P261 - Evitar respirar el polvo o la niebla de pulverización.

P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280 - Llevar guantes y prendas de protección.

P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 - Recoger el vertido.

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

7. Presentación:

Envase 10 Kg.

8. Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo:

Insecticida de contacto para uso profesional, en cultivos al aire libre mediante incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador. Realizar una única aplicación por campaña.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	Nº APLICACIONES	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. (días)
Algodonero, girasol, nabo, Rábano	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>),	10-15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Camelina, cártamo, colza, mostaza/mostaza blanca y sésamo/anjolí	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , <i>Melolontha spp.</i> Gusanos grises, rosquillas, <i>Agrotis spp.</i>	10-15	1	Aplicación durante la siembra.	NP
Guisante verde, haba verde, judía verde, tabaco, tomate	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), escarabajo sanjuanero (<i>Melolontha spp.</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>)	10-15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Zanahoria	Gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>), mosca de la zanahoria (<i>Chamaepsila rosae</i>)	10-15	1		NP
Hortalizas del género Brassica	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), escarabajo sanjuanero (<i>Melolontha spp.</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>), mosca de la col (<i>Delia radicum</i>)	10-15	1	Aplicación antes o durante la siembra. Para brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col y coles de China.	NP
Maíz	Diabrotica del maíz (<i>Diabrotica virgifera</i>), elatéridos (<i>Elateridae</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>)	10-15	1	Aplicación antes o durante la siembra. También maíz dulce.	NP

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	Nº APLICACIONES	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. (días)
Apio, colinabo, hinojo	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), escarabajo sanjuanero (<i>Melolontha</i> spp.), gorgojos de las coles (<i>Ceuthorynchus</i> spp.), gusanos del alambre (<i>Agriotes</i> spp.), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis</i> spp.), miriápodos, mosca de la cebolla (<i>Delia antiqua</i>), mosca de la zanahoria (<i>Chamaepsila rosae</i>), pulguilla de la remolacha (<i>Chaetocnema tibialis</i>), típulas (<i>Tipulidae</i>), Escarabajo sanjuanero, <i>Melolontha</i> spp	15-20	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Berenjena, lechuga y similares	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), escarabajo sanjuanero (<i>Melolontha</i> spp.), gorgojos de las coles (<i>Ceuthorynchus</i> spp.), gusanos del alambre (<i>Agriotes</i> spp.), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis</i> spp.), miriápodos, mosca de los sembrados (<i>Delia platura</i>), mosca de la zanahoria (<i>Chamaepsila rosae</i>), pulguilla de la remolacha (<i>Chaetocnema tibialis</i>), típulas (<i>Tipulidae</i>)	15-20	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	Nº APLICACIONES	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. (días)
Melón	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), gorgojos de las coles (<i>Ceuthorynchus spp.</i>), gusanos del alambre (<i>Agriotes spp.</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>), miriápodos, mosca de la zanahoria (<i>Chamaepsila rosae</i>), mosca de los sembrados (<i>Delia platura</i>), pulguilla de la remolacha (<i>Chaetocnema tibialis</i>), típulas (<i>Tipulidae</i>)	15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Sandía	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), gorgojos de las coles (<i>Ceuthorynchus spp.</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis spp.</i>), miriápodos, mosca de la zanahoria (<i>Chamaepsila rosae</i>), pulguilla de la remolacha (<i>Chaetocnema tibialis</i>), típulas (<i>Tipulidae</i>)	15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Gusanos del alambre (<i>Agriotes spp.</i>), mosca de los sembrados (<i>Delia platura</i>)	15-20			
Soja	Escarabajo sanjuanero , <i>Melolontha spp.</i>	10-15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Elatéridos, Elateridae Gusanos del alambre, <i>Agriotes spp.</i> Gusanos grises, rosquillas, <i>Agrotis spp.</i> Mosca de los sembrados, <i>Delia platura</i> Pulguilla de la remolacha, <i>Chaetocnema tibialis</i>	12-15	1	Aplicación antes o durante la siembra.	NP

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	Nº APLICACIONES	CONDICIONAMIENTOS ESPECÍFICOS	P.S. (días)
Sorgo	Diabrotica del maíz (<i>Diabrotica virgifera</i>), elatéridos (<i>Elateridae</i>), gusanos del alambre (<i>Agriotes</i> spp.), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis</i> spp.), miriápodos (exclusivamente contra <i>Scutigera immaculata</i>), mosca de los sembrados (<i>Delia platura</i>), tóxicas (<i>Tipulidae</i>)	12 – 15	1	Aplicación durante la siembra.	NP
Remolacha azucarera	Elatéridos (<i>Elateridae</i>), gusanos grises, rosquillas (<i>Agrotis</i> spp.), pulgilla de la remolacha (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	15-20	1	Aplicación durante la siembra.	NP
	Maripaca de la remolacha (<i>Aubeonimus mariaefranciscae</i>)	20			

9. Observaciones:

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo. No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas.

10. Manejo de resistencias:

Teflutrin pertenece al grupo de los moduladores del canal de sodio. Se recomienda realizar una gestión integrada de plagas. Para evitar la aparición de resistencias, siga las instrucciones de la etiqueta. No reduzca las dosis recomendadas, y respete el momento de aplicación. Alternar con insecticidas con distinto modo de acción.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC:

GRUPO	3 ^a	INSECTICIDA
-------	----------------	-------------

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.